



CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE

Servizio di consulenza ai soci 2018

extenda Vitis

consulenza e trasferimento
dell'innovazione in viticoltura

**COMUNICATO TECNICO
n° 7 - 2018 (23-6-2018)**

OIDIO della vite

L'andamento climatico in giugno è stato alternante e spesso favorevole all'OIDIO.
I primi sintomi su grappolo sono comparsi in vigneti di Pinot, di Chardonnay e meno di Glera.

CRITERI PER LA DIFESA

E' necessario intervenire su due fronti:
LA GESTIONE DELLA CHIOMA e la DIFESA DIRETTA.

GESTIONE DELLA CHIOMA

E' utile esporre i grappoli alla luce (l'oidio è sensibile alla luce) ed alla ricezione dei prodotti antiparassitari:

- **Palizzare** ("tirare su") i germogli, senza ammassare eccessivamente la vegetazione sui grappoli;
- **Sfogliare** nella zona dei grappoli: se non si è fatto all'allegagione.
Attenzione alle scottature! Perciò farla leggera e solo nella parete est o nord.

DIFESA DIRETTA

- Trattare orientando bene i getti nella zona dei grappoli usando alti volumi d'acqua,
- usare solfo micronizzato (impiegabile a dosi alte senza rischio di tossicità);
- o anche la solforazione in polvere;
- o antioidici che si legano alle cere.

Consultare il protocollo inviato.

In caso di attacchi in atto:

- trattare **andata e ritorno** per lo stesso filare;
- ripetere il trattamento dopo 4-5 giorni .
- **NON usare IBS (Pericolo di indurre resistenze)**
- Trattare nelle ore meno calde



BLACK ROT

Quest'anno le macchie di black rot sono apparse molto presto sulle foglie. Attualmente compaiono sintomi sui grappoli dei pinot, del merlot e dello chardonnay, meno spesso del glera. Il pericolo sussiste per il fatto che i danni ai grappoli continuano fino alla vendemmia.

La difesa contro questo fungo va eseguita su due fronti:

- Eliminare l'inoculo presente nelle mummie dei grappoli dell'anno precedente.
- Attuare una difesa diretta con alcuni prodotti usati anche per escoriosi, oidio e peronospora.

In questa fase, quando compare nei grappoli è necessario usare prodotti con azione diretta.

- Inibitori dello sterolo (**fenbuconazolo – tetraconazolo – difeconazolo**)
- Strobilurine (es. **azoxistrobin**)
- Rame

Queste sostanze (con esclusione del rame) sono soprattutto antioidici ed hanno limiti di impiego, quindi è bene consultare il “protocollo difesa” e leggere le etichette.

(attacchi gravi di black rot su grappoli)

